

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN Á SITUACIÓN DE RISCO EN RELACIÓN Á INFLUENZA AVIARIA

O pasado 16 de xaneiro de 2023, desde este Servizo de Sanidade Animal enviouse unha comunicación sobre o asunto de referencia na que, tras a análise continua de risco levada a cabo en Galicia e no resto do Estado, informábase dun aumento do risco de aparición da influenza aviaria de alta patoxenicidade (en diante IAAP) no noso territorio.

Como consecuencia do citado aumento de risco, adoptáronse naquel momento unha serie de medidas sanitarias que afectaban aos concellos incluídos nas denominadas zonas de especial vixilancia (ZEV) e zonas de especial risco (ZER) de acordo coa Orden APA/2442/2006, de 27 de xullo, pola que se establecen medidas específicas de protección en relación coa IAAP.

Na data actual considérase concluído o período migratorio das aves silvestres invernantes procedentes do Norte e Centro de Europa, que constitúen o principal vehículo de transmisión desta doenza ás especies de aves domésticas e silvestres autóctonas. Por outra banda, no rexistro de focos notificados desta enfermidade, tanto en aves silvestres como en domésticas, detéctase nas últimas semanas un paulatino descenso deles en todos os países da Unión Europea, incluído España.

Ante esta situación epidemiolóxica, a análise continua de risco concluíu nunha significativa diminución do risco de aparición da IAAP nas aves, polo que o pasado 11 de maio, as autoridades competentes en sanidade animal das Comunidades Autónomas máis o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) acordaron o **levantamento das medidas de restrición sanitaria** vixentes desde o pasado 20 de decembro de 2022 en España nas citadas zonas ZER e ZEV.

Os concellos que forman parte de cada zona, así como a situación en canto ás medidas adoptadas neles desde o pasado 11/05/2023, detállanse no anexo a este escrito. Estas medidas foron comunicadas recentemente desde a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias a todos os concellos incluídos nambas zonas. Así mesmo, o sector avícola de Galicia foi informado puntualmente desta nova situación e achegóuselle información sobre o mantemento das medidas de bioseguridade nas explotacións avícolas, que tamén se detallan no anexo.

Non obstante este escenario de menor risco, e importante continuar mantendo **unha adecuada vixilancia pasiva das aves tanto domésticas como silvestres** que se atopen enfermas ou mortas debido á unha sospeita por influenza aviaria, principalmente nos territorios incluídos en zonas ZER e ZEV, pero tamén en calquera outra localización do territorio de Galicia. De acordo coa Lei 8/2003 de sanidade animal, calquera persoa, e especialmente o persoal veterinario, teñen a obriga de comunicación dunha sospeita desta patoloxía de xeito inmediato aos Servizos Veterinarios Oficiais da Consellería do Medio Rural.





No caso das aves domésticas, segundo o establecido na citada Orden APA/2442/2006, poden ser signos significativos de presenza de influenza aviaria os seguintes:

- Caída do consumo do penso e da auga superior ao 20 %.
- Caída na posta de ovos superior ao 5 % durante máis de 2 días seguidos.
- Mortalidade superior ao 3 % durante una semana, sen causa xustificada.
- Calquera signo clínico ou lesión post- mortem compatible coa influenza aviaria.

En aves silvestres os signos clínicos son menos evidentes podendo afectar a un único individuo ou ben a un grupo máis ou menos numeroso de aves silvestres.

Por todo o anterior, solicitamos desde o Colexio Oficial Veterinario a difusión desta información entre os veterinarios colexiados, como axentes de interese no programa de vixilancia pasiva desta enfermidade.

Finalmente indicámoslles onde poden atopar información de interese sobre a influenza aviaria:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/influenza-aviar/influenza_aviar.aspx

<https://mediorural.xunta.gal/gl/temas/gandaria/sanidade-animal/programas-oficiais/influenza-aviaria>

Por outra banda, no seguinte enlace pódese realizar a búsqueda das diferentes Oficinas Rurais da Consellería do Medio Rural.

<https://www.xunta.gal/servizos-no-mapa>

Agradecendo coma sempre a súa colaboración, reciban un saúdo.

Santiago de Compostela, data da sinatura electrónica
O xefe do Servizo de Sanidade Animal

Jesús Javier Orejas Fernández





ANEXO

ZONA ZER

Concellos incluídos:

- Provincia de Pontevedra: A Illa de Arousa, Cambados, Meaño, O Grove, Sanxenxo, Ribadumia e Vilanova de Arousa.

ZONA ZEV

Concellos incluídos:

- Provincia da Coruña: Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo e Zas.
- Provincia de Lugo: Ribadeo e Trabada.
- Provincia de Ourense: Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos e Xinzo de Limia.
- Provincia de Pontevedra: A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa e Vilagarcía de Arousa.
-

MEDIDAS VIXENTES

En **toda a comunidade autónoma de Galicia (incluída a zona ZEV)**:

- As concentracións de aves de calquera tipo, comerciais ou non (exhibicións, concursos...), tanto de aves de curral como doutras aves distintas a estas (p. ex. aves ornamentais ou similares) estarán condicionadas á autorización previa por parte das consellerías do Medio Rural (no caso das aves de curral) ou de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
- É obrigatoria a inscrición dos currais familiares de autoconsumo no Rexistro Galego de Explotacións Avícolas da Consellería do Medio Rural.

Na zona **ZER**, ademais das anteriores:

- Permítese a cría de aves ao aire libre sempre que se alimente e subministre auga ás mesmas no interior das instalacións, ou de xeito que se impida o contacto das aves silvestres coa auga ou alimento destinados ás aves domésticas.
- Continúa prohibido o uso de reclamos de caza con aves do tipo anátidas (parrulos ou similares) e charadriiformes (gavotas e similares).
- Continúa prohibida a cría de parrulos, ocas e gansos xunto con outras especies de aves de curral.
- Continúa prohibido darlles ás aves de curral auga procedente de depósitos superficiais, fontes ou outras orixes nas que puideran ter acceso as aves silvestres, salvo que a auga fora sometida a un tratamento de hixienización que garanta a inactivación de posibles virus da influenza aviaria.





- Os depósitos de auga de subministro para as aves domésticas, que puidera haber no exterior, deben continuar protexidos para impedir que poidan acceder as aves silvestres ou as súas dexeccións.

Como información adicional de interese engádense **recomendacións de bioseguridade** a aplicar en todo o territorio de Galicia, información trasladada ao sector avícola:

- Evitar que as aves domésticas entren en contacto directo ou indirecto con aves silvestres e especialmente con aves acuáticas, e dentro delas coas anátidas.
- Protexer os comedeiros e os bebedeiros das aves de curral, evitando que accedan a eles as aves silvestres.
- Evitar darlle de beber ás aves de curral auga á que puideran ter accedido aves silvestres.
- Protexer os depósitos de auga, impedindo que as aves silvestres accedan á mesma ou as súas dexeccións. Ter limpo de maleza e restos da actividade gandeira dous metros arredor do perímetro das naves.
- Evitar criar parrulos, gansos ou ocas xunto con outras especies de aves de curral.
- Ter limpos e desinfectados os locais onde se almacenen os pensos e os utensilios da granxa.
- Evitar a entrada de aves e outros animais silvestres ao interior das instalacións mediante sistemas de protección nas fiestras (maias paxareiras), e ter pechados os ocos de posible entrada (xuntas, canaletas, tellados...).
- Limitar ao mínimo imprescindible as visitas, tanto de persoas como de vehículos.
- Non soltar as aves de curral nos terreos próximos á beira das charcas, encoros ou outros humedais onde haxa presenza de aves silvestres migratorias, especialmente se son anátidas.
- As persoas relacionadas con granxas avícolas comerciais que posúan tamén unha explotación avícola de tipo curral familiar, deben evitar ter contacto con aves dunha e outra explotación sen previamente tomar as axeitadas medidas de bioseguridade (lavado de roupa, lavado de mans...), especialmente se as aves do galiñeiro familiar teñen posibilidade de contactar con aves silvestres.
- As persoas titulares ou traballadoras en explotacións ou titulares de currais familiares de calquera tipo, se realizan actividade cinexética de caza menor de aves, deben manter as citadas adecuadas prácticas de bioseguridade unha vez finalizada a actividade cinexética, procurando no entrar en contacto coas aves domésticas da súa propiedade.

